

RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DES PATIENTS

Un professionnel de la santé doit transmettre les renseignements qui suivent au patient.

Ce médicament ne doit pas être avalé; il doit être gardé sous la langue ou dans la bouche. Dans la mesure du possible, les patients doivent prendre NITROSTAT (comprimés de nitroglycérine) en position assise. Cette précaution élimine le risque de chute en cas d'étourdissements ou de vertiges. Un mal de tête (éventuellement intense) peut survenir peu après avoir pris ce médicament (voir la rubrique PRÉCAUTIONS).

La nitroglycérine peut entraîner des étourdissements, des vertiges et une syncope. Les patients fortement sensibles aux effets vasodilatateurs de la nitroglycérine devraient éviter d'effectuer des tâches pouvant être dangereuses, comme conduire un véhicule ou opérer une machine, jusqu'à ce qu'on sache si ce médicament altère leur capacité à mener ces activités.

Les patients qui prennent NITROSTAT (nitroglycérine) ne doivent pas prendre d'inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5 (PDE5) tel que le citrate de sildénafil (VIAGRA). L'association de ces deux médicaments peut provoquer une baisse grave de la tension artérielle, une perte de conscience, une crise cardiaque ou la mort.

La nitroglycérine administrée par voie sublinguale peut provoquer une sensation de brûlure ou de picotement; toutefois, ce phénomène ne constitue pas une indication fiable de l'action du médicament et ne doit pas servir à déterminer l'efficacité des comprimés.

La nitroglycérine doit être conservée dans son flacon d'origine en verre, que l'on doit garder bien fermé, à une température constante (entre 15 et 30 °C). Jeter le tampon d'ouate une fois le flacon ouvert.