

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

rend sensible à la phénylalanine que contient l'aspartame.

Granules COLESTID^{MD}
(chlorhydrate de colestipol pour suspension orale, USP)
Granules COLESTID^{MD} ORANGE
(chlorhydrate de colestipol pour suspension orale)
Comprimés COLESTID^{MD}
(comprimés de chlorhydrate de colestipol)

L'ingrédient médicamenteux
Chlorhydrate de colestipol

Les ingrédients non médicamenteux
Granules COLESTID :
Silice colloïdale

Granules COLESTID ORANGE :
Aspartame, bêta-carotène, acide citrique, glycérine, mannitol, maltol, méthylcellulose, arômes artificiel et naturel

Comprimés COLESTID :
Cire de carnauba, phtalate d'acétate de cellulose, silice colloïdale, hypromellose, stéarate de magnésium, povidone et triacétine

La présentation
Les granules COLESTID pour suspension orale, USP, sont présentés en sachets en pellicule d'aluminium. Chaque sachet contient 5 g de chlorhydrate de colestipol.

Les granules COLESTID ORANGE pour suspension orale sont présentés en sachets en pellicule d'aluminium. Chaque sachet contient 5 g de chlorhydrate de colestipol.

Les comprimés COLESTID sont présentés en flacons. Chaque comprimé contient 1 g de chlorhydrate de colestipol.

Le présent dépliant s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Il n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de COLESTID. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Les raisons d'utiliser ce médicament

COLESTID, associé à un régime standard visant à abaisser le taux de cholestérol et à un programme d'exercice, aide à réduire la quantité de cholestérol dans le sang. Il se peut que votre médecin vous recommande de perdre du poids en plus de vous prescrire COLESTID.

Votre médecin vous prescrira un régime spécial pour aider à faire baisser votre cholestérol. Suivez le régime tout en prenant COLESTID. Le traitement par COLESTID ne remplace pas la nécessité de suivre un régime spécial. Il est important que votre traitement global comprenne ces deux mesures.

Les effets de ce médicament

COLESTID empêche le passage des acides biliaires dans le sang.

Les acides biliaires sont formés à la suite de la dégradation du cholestérol. COLESTID agit en piégeant les acides biliaires dans l'intestin. Les acides biliaires piégés par COLESTID sont éliminés de l'organisme plutôt que de passer dans la circulation sanguine. Comme la quantité d'acides biliaires diminue, l'organisme est obligé de dégrader davantage de cholestérol, ce qui entraîne une baisse du taux de cholestérol dans le sang.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament

Ne prenez pas COLESTID :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au chlorhydrate de colestipol ou à tout autre ingrédient de COLESTID;
- si vous avez un blocage des intestins ou des canaux biliaires (tubes dans lesquels la bile passe);
- si vous présentez une phénylcétonurie, ne prenez pas les granules COLESTID ORANGE, car ils renferment de l'aspartame, et la phénylcétonurie

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

AVANT de prendre COLESTID, dites à votre médecin ou à votre pharmacien :

- **Les problèmes de santé que vous avez actuellement et que vous avez eus auparavant. Certaines maladies peuvent affecter le taux de cholestérol et doivent être traitées avant d'amorcer un traitement par COLESTID;**
- **Si vous avez une dysprotéïnémie (contenu anormal de protéines – habituellement les immunoglobines – dans le sang), si vous faites du diabète ou si vous avez une maladie de la thyroïde, de la vésicule biliaire, des reins ou du foie;**
- **Si vous avez une carence en vitamines A, D ou K;**
- **Si vous êtes enceinte, si vous le devenez ou si vous allaitez;**
- **Si vous prenez d'autres médicaments, même ceux qui sont en vente libre;**
- **Si vous souffrez du côlon irritable, de diverticulose ou de diverticulite, car la silice colloïdale que contient le médicament peut alors avoir un effet néfaste.**

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

COLESTID peut atténuer l'effet de certains des autres médicaments que vous prenez. **Prenez vos autres médicaments au moins 1 heure avant de prendre COLESTID ou attendez 4 heures après avoir pris COLESTID pour prendre d'autres médicaments.**

Médicaments pouvant interagir avec COLESTID :

- Antibiotiques
- Bêtabloquants (pour abaisser la pression sanguine)
- Digoxine ou digitoxine
- Diurétiques (pour faire uriner)
- Warfarine (pour éclaircir le sang)
- Mofétilmycophénolate (un immunosuppresseur)

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Posologie habituelle chez l'adulte

Granules COLESTID ou granules COLESTID ORANGE :

De 5 à 30 g par jour en une ou plusieurs prises. La dose de départ habituelle est de 5 g 1 ou 2 fois par jour.

Comprimés COLESTID :

De 2 à 16 g par jour en une ou plusieurs prises. La dose de départ habituelle est de 2 g 1 ou 2 fois par jour.

La dose peut être augmentée à intervalles d'un mois. Le médecin déterminera quelle posologie vous convient le mieux.

Posologie habituelle chez l'enfant de 10 ans ou plus :

C'est le médecin qui fixera la dose. On recommande d'utiliser la dose la plus faible de granules.

Granules COLESTID ou granules COLESTID ORANGE :

Ne prenez ni les granules COLESTID ORANGE USP ni les granules COLESTID sous leur forme sèche, car vous pourriez vous étouffer.

Un jus épais ou pulpeux pourrait réduire la sensation grumeleuse que donne le médicament.

Un jus non sucré peut améliorer le goût de COLESTID.

PRÉPARATION

COLESTID doit toujours être mélangé à des liquides ou à des aliments.

* Vous pouvez utiliser les liquides suivants : eau, lait, boissons aromatisées, jus ou tout autre liquide de votre choix.

* Vous pouvez utiliser les aliments suivants : céréales (chaudes ou froides), soupes (éviter les soupes avec de gros morceaux), yogourt, crème-dessert, fromage cottage ou fruits à pulpe (ananas broyés, poire, pêche ou salade de fruits).

Étape 1. Ajouter la quantité prescrite de COLESTID (sachets ou cuillerées) à au moins 100 mL (3 à 4 onces) de liquide ou d'aliment.

Étape 2. Remuer le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Le médicament ne se dissout pas complètement dans les liquides; vous pouvez y voir encore des granules.

Étape 3. Boire ou manger tout le mélange. Quand vous avez fini, rincer le verre ou le bol avec une petite quantité de liquide que vous avalerez pour être sûr d'avoir pris tout le médicament.

Comprimés COLESTID :

Ne pas couper, mâcher ni broyer les comprimés.

Avaler les comprimés COLESTID tout rond. Les avaler avec un verre plein de liquide. Ce liquide peut être de l'eau, du lait, une boisson aromatisée, un jus, une boisson gazeuse ou tout autre liquide de votre choix.

Il faut prendre les comprimés COLESTID pendant les repas. Si vous prenez les comprimés COLESTID plus d'une fois par jour, prenez une dose au petit-déjeuner ou au repas du midi, puis une seconde dose au repas du soir.

Surdosage

En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même si vous n'avez aucun symptôme.

Dose oubliée

Si vous oubliez de prendre une dose du médicament, prenez-la aussitôt que possible. Ensuite, continuez selon l'horaire habituel. Mais, si vous oubliez de prendre une dose et qu'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas les deux doses en même temps. Prenez seulement la dose prévue à cette heure-là.

Ne prenez pas une double dose de COLESTID pour remplacer une dose oubliée.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Effets secondaires possibles :

- Aggravation des hémorroïdes et saignement des hémorroïdes
- Nausées, ballonnement, gaz, brûlures d'estomac, vomissements, perte d'appétit
- Maux de tête, anxiété, étourdissements, somnolence
- Fatigue, faiblesse, insomnie

Si ces effets persistent ou s'aggravent, téléphonez à votre médecin. Si vous éprouvez des effets inhabituels non mentionnés ci-dessus, consultez votre médecin.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE				
Symptôme / effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et consultez d'urgence un médecin	
	Seulement dans les cas sévères	Dans tous les cas		
Fréquence				
Très fréquents	Constipation	✓		
	Maux d'estomac	✓		
Fréquents	Diarrhée	✓		
	Douleur aux muscles, aux articulations et au dos	✓		
	Sang dans les selles	✓		
	Essoufflement	✓		
	Vertige	✓		
	Ulcères	✓		
	Réaction cutanée : éruption	✓		
	Inflammation de la vésicule biliaire, calculs biliaires (douleur abdominale si intense qu'il est impossible de rester assis ou de trouver une position confortable)	✓		
Peu fréquents	Taux élevé d'enzymes hépatiques	✓		
	Réaction allergique : éruption cutanée, urticaire, enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer			✓

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

Symptôme / effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et consultez d'urgence un médecin
	Seulement dans les cas sévères	Dans tous les cas	
Douleur dans la poitrine		✓	
Battements rapides du cœur		✓	

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. En cas d'effet inattendu ressenti lors de la prise de *COLESTID*, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé.

CONSERVATION DU MÉDICAMENT

Garder hors de la vue et de la portée des enfants. Conserver les comprimés *COLESTID* à l'abri de la chaleur, des rayons du soleil directs et des endroits humides comme la salle de bain. La meilleure façon de conserver les comprimés *COLESTID* est de les entreposer à température ambiante (entre 15 et 30 °C), dans un endroit sec.

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (<http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php>) pour savoir comment déclarer un effet indésirable en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- En composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète du produit, préparée à l'intention des professionnels de la santé, à l'adresse <http://www.pfizer.ca> ou en téléphonant au promoteur, Pfizer Canada SRI, au 1-800-463-6001.

Pfizer Canada SRI a rédigé ce dépliant.

Dernière révision : 22 janvier 2020