

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

**Pr Métronidazole injectable USP
(métronidazole)
Solution à 5 mg/mL**

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie de la « monographie de produit » publiée par suite de l'homologation de Métronidazole injectable USP pour la vente au Canada et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de Métronidazole injectable USP. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Les raisons d'utiliser ce médicament :

Métronidazole injectable USP est utilisé pour :

- traiter les infections de la cavité abdominale, du cerveau et du poumon;
- prévenir les infections chez les patients subissant une chirurgie colorectale.

Les médicaments antibactériens comme Métronidazole injectable USP traitent seulement les infections bactériennes. Ils ne traitent pas les infections virales comme le rhume. Même s'il est possible que vous vous sentiez mieux peu après avoir commencé le traitement, Métronidazole injectable USP doit être utilisé exactement comme il a été prescrit. Une mauvaise utilisation ou la surutilisation de Métronidazole injectable USP peut entraîner la prolifération de bactéries qui ne seront pas éliminées par Métronidazole injectable USP (résistance). Cela signifie qu'il est possible que Métronidazole injectable USP ne soit plus efficace pour vous à l'avenir. Ne partagez pas votre médicament.

Les effets de ce médicament :

Métronidazole injectable USP tue les bactéries qui causent l'infection.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

Ne prenez pas Métronidazole injectable USP et informez votre médecin si :

- vous êtes allergique (hypersensible) au métronidazole;
- vous êtes allergiques (hypersensible) à l'un des ingrédients non médicinaux contenus dans la préparation (voir la section « Les ingrédients non médicinaux importants ») ou à l'un des composants du contenant souple en PVC;
- vous avez une maladie du système nerveux;
- vous avez des antécédents de maladie du sang, d'hypothyroïdie (déficit de la glande thyroïde) ou d'insuffisance surrénale (déficit de la glande surrénale).

L'ingrédient médicinal :

Métronidazole

Les ingrédients non médicinaux :

Acide citrique
Chlorure de sodium
Phosphate de sodium dibasique
Eau pour préparations injectables

La présentation :

5 mg/mL, solution stérile

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière AVANT d'utiliser Métronidazole injectable USP si :

- vous avez d'autres infections;
- vous avez le syndrome de Cockayne;
- vous avez consommé de l'alcool;
- vous avez des troubles des reins;
- vous avez des troubles du foie;
- vous avez une maladie active ou chronique sévère du système nerveux;
- vous avez un trouble sanguin, quel qu'il soit (p. ex., éosinophilie transitoire, leucopénie ou autre);
- vous avez déjà présenté de l'œdème (enflure des jambes, des chevilles ou des pieds);
- vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir;
- vous allaitez ou prévoyez allaiter, car le métronidazole est excrété dans le lait maternel;
- vous êtes âgé de moins de 18 ans.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Comme pour la plupart des médicaments, des interactions avec d'autres médicaments sont possibles. Avisez votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments prescrits par un autre médecin, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels et les produits de médecine parallèle.

Les médicaments suivants peuvent interagir avec Métronidazole injectable USP :

- le disulfirame;
- les médicaments utilisés pour éclaircir le sang, tels que la warfarine (Coumadin);
- le phénobarbital ou la phénytoïne (Dilantin);
- le vécuronium;
- le lithium;
- le busulfan (Myleran[®]);
- le 5-fluorouracile.

En cas d'incertitude, discutez avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre du métronidazole.

Ne buvez pas d'alcool pendant que vous recevez Métronidazole injectable USP. La consommation d'alcool en association avec le métronidazole pourrait causer des maux de tête et des bouffées vasomotrices.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Posologie habituelle chez les adultes :

La dose appropriée est choisie par un professionnel de la santé et administrée par une veine.

Surdose :

En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, l'urgence d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même si vous n'avez pas de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous oubliez votre perfusion prévue, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière le plus tôt possible pour organiser votre prochain traitement.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Effets secondaires possibles :

- nausées, diarrhée, vomissements, constipation;
- indigestion, perte d'appétit;
- douleur abdominale;
- sécheresse buccale, langue chargée (blanchâtre);
- goût métallique désagréable dans la bouche;
- urine foncée;
- miction (action d'uriner) douloureuse;
- bouffées vasomotrices;
- maux de tête;
- difficulté à dormir, sensation de fatigue;
- éruption cutanée et démangeaisons.

Métronidazole injectable USP peut fausser les résultats des épreuves sanguines. Votre médecin décidera du moment d'effectuer des tests sanguins et en interprétera les résultats.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE			
Symptôme / effet	Consultez votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et obtenez des soins médicaux immédiatement
	Cas sévères seulement	Dans tous les cas	
Réaction allergique : éruption cutanée, cloques, ulcères buccaux, urticaire, enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer, fièvre			√
Troubles cardiaques : douleur à la poitrine, battements cardiaques anormalement rapides, prononcés ou irréguliers, difficulté à respirer (dyspnée)		√	
Troubles de la vue : vision trouble, perte de la vision		√	
Troubles gastro-intestinaux : pancréatite (inflammation du pancréas) présentant des symptômes comme une douleur abdominale sévère qui pourrait s'étendre jusqu'au dos, particulièrement associée à des nausées, des vomissements et de la fatigue. Douleurs abdominales, diarrhées qui peuvent contenir du sang, fièvre		√	
Troubles du système nerveux : incapacité à coordonner des mouvements volontaires, difficultés à utiliser ses bras et ses jambes, sensation de confusion, convulsions, raideur de la nuque associée au mal de tête, étourdissements, somnolence et insomnie			√
Troubles de la peau : engourdissement, sensation de brûlure, picotements, douleurs aux mains ou aux pieds, sensibilité au toucher		√	
Infection vaginale à levures : sécheresse, sensation de brûlure et pertes vaginales		√	
Troubles musculaires : spasmes musculaires		√	

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

Symptôme / effet	Consultez votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et obtenez des soins médicaux immédiatement
	Cas sévères seulement	Dans tous les cas	
Troubles généraux et réactions au point d'administration : réactions au point d'injection, malaise, œdème facial, œdème périphérique, frissons, douleur, brûlure ou enflure au point d'injection			√

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète du produit, préparée pour les professionnels de la santé, en communiquant avec Pfizer Canada inc., au 1-800-463-6001.

Ce dépliant a été préparé par :

Pfizer Canada inc.
Kirkland (Québec) H9J 2M5

Dernière révision : 18 septembre 2018

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. En cas d'effet inattendu ressenti lors de la prise de Métronidazole injectable USP, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Conserver à la température ambiante (20 °C à 25 °C), à l'abri de la lumière et du gel.

Conserver hors de la portée et de la vue des enfants.

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment déclarer un effet indésirable en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- En composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets indésirables, veuillez consulter votre professionnel de la santé. Le programme Canada Vigilance ne prodigue pas de conseils médicaux.